



Taxus cuspidata



Høyde	2.5 - 5 m
Bredde	3-5m
Krone	spherical, irregular, later broader, dark, dense crown
Bark og grener	reddish brown, flaking bark, twigs green
Blad	needles, deep dark green, 1.5 - 3 cm, evergreen
Blomster	unremarkable, dioecious, yellow buds, green
Frukt	brownish black seeds, covered 4/5 with a fleshy, red case
Torner	Ingen
Giftighet	har giftige komponenter
Jordtype	sandy, loamy soil, well-permeable
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, gir mat til fugler
Anvendelse	tretønner, tak hager, industriområder, små hager, terrassehager
Form	prakteksemplar bartrær
Opprinnelse	Eastern Asia

En saktevoksende, tett forgrenet busk som kan vokse til et flerstammet, uregelmessig tre. I sitt naturlige utbredelsesområde blir den 15 - 20 m høy, men i dyrking blir den ikke høyere enn ca. 5 m. Stammen er rødbrun og flassende. Grenene vokser spredt og litt oppreist og er tett dekket av korte sidegreiner. De svært mørkegrønne nålene er linjeformede og spisse. De er lysere grønne på undersiden, og den korte stilken er gulaktig. Den uanselige blomstringen etterfølges av frø, hvorav 4/5 er omgitt av et ca. 0,5 cm langt kjøttfullt, rødt hylster. På grunn av sin bedre herdighet enn *T. baccata* er denne arten mye dyrket i USA og Canada. I Europa brukes *T. cuspidata* mest til beskjæring (bonsai) på grunn av sin flerstammede vekst.