



Acer xfreemanii 'Armstrong'



Høyde	10 -15 m
Bredde	4-6m
Krone	columnar, dark, dense crown
Bark og grener	no particulars
Blad	3/5 lobes, green, 10 -20 cm
Høstfarge	oransje, rød
Blomster	flower corymbs, red, March/April
Frukt	none, fruitless cultivar
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	not too limy
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindmotstand	very good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	avenyer og brede gater, smale gater
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Scanlon Nurseries, Ohio, USA, 1951
Synonymer	Acer rubrum 'Armstrong'

Sorten Acer xfreemanii 'Armstrong' oppsto i USA i 1951 og ble inntil nylig regnet som A. rubrum. Nyere studier har vist at 'Armstrong' stammer fra en krysning mellom A. rubrum og A. saccharinum og derfor tilhører hybridene Acer x freemanii. Denne hybridene har ikke bare oppstått ved menneskelig aktivitet, men forekommer også i naturen i USA. Bladene er tre- til femflikete og grønne. Undersiden er grågrønn. Den vakre oransjerøde høstfargen kan i vårt land bare sees etter varme somre. Er bredrottet med fin forgrening. 'Armstrong' krever en jord som ikke er for kalkholdig. Treet trives godt i belegningsstein, noe som gjør det ideelt til bruk i trange gater og alléer.