



Acer davidii



Høyde	8 - 12 (15) m
Bredde	7-11m
Krone	oval to round, light, open crown, capricious growing
Bark og grener	twigs purple with greyish white longitudinal stripes
Blad	oval to elongated, dark green, 8 - 16 cm
Høstfarge	gul, oransje, rød
Blomster	pendent corymb-shaped racemes, light yellow, May
Frukt	single-seeded, single-winged, light green
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	all soils
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	tretønner, tak hager
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Central China

Med sin påfallende stripete bark hører Acer davidii, i likhet med A. capillipes og A. rufinerve, til de såkalte "slangeskinnlønnene". De unge kvistene er mørk purpurrøde og beholder denne fargen selv om vinteren. De eldre kvistene og stammen har de karakteristiske gråhvite, langsgående stripene. Bladene er mindre tydelig flikete, og i motsetning til A. capillipes er de hårete på undersiden langs nervene. Hos unge planter er bladene treflikete, hos gamle(re) trær er de uflikete. Blomstene er enkjønnet, med hann- og hunnblomster på samme plante. Planten har et sterkt forgrenet og kompakt rotsystem. Ettersom planten er mindre egnet til å plante i belegningsstein, er bruken begrenset til solitærplanting i parker og større hager. Dette prydtreet gjør seg også godt i grønne belter.