




Acer negundo



Høyde	15 - 20 m, fast growing
Bredde	12-16m
Krone	wide, more or less round, half-open crown
Bark og grener	young twigs shiny green and pruinose
Blad	unevenly feathered, fresh green, up to 20 cm, feathered leaf
Blomster	male in thick clusters, female in racemes, April
Frukt	falcate, winged nutlets, in racemes
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, tolerant to calcareous soil
Jordfuktighet	tåler kort flom, tåler lang flom
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	moderate
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler
Anvendelse	industriområder
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	central and eastern part of North America

Acer negundo er et mellomstort til stort tre som vokser raskt og har en bred krone. De unge kvistene er blankt grønne og vanligvis lysegråmattede. Det nederlandske navnet vederesdoorn har planten fått på grunn av de fligete bladene, et kjennetegn som bare denne arten og de avledede kultivarene har. Bladene er ujevnt flikete og har 3 til 7 småblad. A. negundo er tokjønnnet, og blomstene er enkjønnet. Han- og hunnblomster er plassert i separate blomster på forskjellige trær. Hannblomstene sitter i kompakte bunter med vanligvis fire blomster sammen. Hunnblomstene sitter i lange, hengende klaser. Som hos andre lønnearter har fruktene de typiske "vingene" som kalles samaraer. Treet vokser i både våte og tørre miljøer. Har en dyptgripende hovedrot med kraftig forgrening.