




## Cornus controversa 'Variegata'



<b>Høyde</b>	5 - 7 (10) m
<b>Bredde</b>	5-7m
<b>Krone</b>	round, branching in layers, half-open crown, capricious growing
<b>Bark og grener</b>	green with shallow grooves
<b>Blad</b>	broad ovate to broad oval, 8 - 15 cm long, white-edged
<b>Blomster</b>	cream white, in 15 cm umbel-shaped corymbs, May/June
<b>Frukter</b>	small dark-blue berry
<b>Torner</b>	Ingen
<b>Giftighet</b>	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
<b>Jordtype</b>	any, if well-drained, except dry sandy soil
<b>Belegning</b>	tåler ingen belegning
<b>Vinterherdighetssone</b>	6b (-20,5 til -17,8 °C)
<b>Vindmotstand</b>	good
<b>Andre motstander</b>	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
<b>Faunatre</b>	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, gir mat til fugler
<b>Anvendelse</b>	tretønner, små hager, terrassehager
<b>Form</b>	flerstammet tre
<b>Oprinnelse</b>	Veitch Nurseries, UK, before 1890

Et lite tre med horisontal forgrening, med greiner i etasjer over hverandre, noe som gir en karakteristisk vekstform. Kronen blir etter hvert like bred som den er høy. De unge kvistene blir fra grønne til grønnbrune. De alternerende bladene er uregelmessige i formen, og de sølvhvite kantene gir treet en spesiell prydverdi. De unge bladene er svakt rosafargede. De store, skjermformede blomsterkronene kan etterfølges av små, mørkeblå bær. Fruktbæringen er imidlertid svært variabel og absolutt ikke garantert i Nederland. På grunn av den tidlige saftstrømmen bør beskjæring finne sted om sommeren eller høsten. Røtter overfladisk med et fint rotssystem.