



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Høyde	15 - 20 m
Bredde	8-12m
Krone	wide ovoid to round, half-open crown
Bark og grener	at a mature age deeply furrowed
Blad	odd-pinnate, 9 - 13 leaflets, deep green, 15 - 25 cm, feathered leaf
Høstfarge	oransje, rød, lilla
Blomster	inconspicuous yellow green, in small panicles, April
Frukt	none, fruitless cultivar
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	not too rich in connection with growth rate
Jordfuktighet	egnet for tørr jord, egnet for våt jord
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindmotstand	poor in the case of a rapid growth
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), motstandsdyktig mot veisalt
Anvendelse	avenyer og brede gater
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Australia, 1920
Synonymer	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Sunn, men ikke sterkvoksende seleksjon med en noe uregelmessig kroneform. F. angustifolia 'Flame' og 'Wollastonii' er identiske med 'Raywood' og kan derfor betraktes som synonymer. Hovedgrenen vokser rett, mens stammegrenene er skråstilte. Barken er grå og dypt rillet senere i livet, og kvistene går fra olivengrønn til grågrønn. 'Raywood' har en lukket krone som ungt tre, eldre trær blir halvåpne. De blanke, dypgrønne bladene består av 9-13 smale småblad. Disse er ca. 5-10 cm lange. Om høsten blir bladene oransjegule til dyp purpurøde. På varmere jord og en varm høst er høstfargen mer intens. Etter den iøynefallende blomstringen er det ingen frukting. På fruktbar jord er veksten ofte raskere enn på dårlig jord. Grenbrudd kan da bli resultatet.