




Quercus coccinea



Høyde	20 - 25 m, fast growing
Bredde	8-15m
Krone	broad ovoid, later rounded, half-open crown
Bark og grener	dark grey to almost black, moderately rough, yellowish-brown twigs
Blad	elongated to oval, with deep pointed lobes, fresh green, 9 - 15 cm
Høstfarge	rød
Blomster	gold coloured ♂ catkins, 6 - 8 cm long, May
Frukt	single acorns, 1.5 - 2.5 cm
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	all types, preferably moist
Jordfuktighet	egnet for våt jord
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, motstandsdyktig mot veisalt
Anvendelse	avenyer og brede gater, industriområder
Form	klarestamme tre, fjæraktig tre, flerstammet tre
Opprinnelse	eastern part of North America

Forekommer i blandede løvskoger i det østlige USA. Danner en bred krone med grener som står horisontalt. Barken er mørkegrå til nesten svart og moderat ru. Q. coccinea har en sterk likhet med Q. palustris. Unge kvister hos Q. coccinea er imidlertid gulbrune, mens de hos Q. palustris er olivengrønne. Bladene er avlange til ovale (noen ganger omvendt ovale) og fjærflikete med 7 - 9 frittstående tannfliker. Mindre dypt innskåret enn hos Q. palustris og 9 - 15 cm lange, 6 - 11 (15) cm brede. Om høsten blir den dypt skarlagensrød. Når den er brun, forblir den på treet til midt på vinteren. De enkle eikenøttene er 1/3 til halvparten omsluttet av luren. Denne er tett dekket av korte, tilstøtende skjell.