




Quercus robur 'Timuki'



Høyde	15 - 20 m
Bredde	8-12m
Krone	round, half-open crown
Bark og grener	twigs dark brown, bark dark grey, deeply grooved
Blad	obovate, lobed, dark greenish purple, 7 - 14 cm
Blomster	green-yellow ♂ catkins, 2 - 4 cm, May
Fruktar	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	fertile and moist
Jordfuktighet	egnet for våt jord
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, motstandsdyktig mot veisalt
Anvendelse	industriområder
Form	klarestamme tre
Opprinnelse	Raimond Cinovskis, Riga, Latvia, 1946

Rødbladet sort av Q. robur med en stort sett eggformet til til slutt rund krone. Vokser betydelig bedre enn den gamle purpurbladede sorten 'Purpurascens'. Barken, blomstringen og fruktene ligner på arten. De omvendt ovale bladene har også samme form som hos arten, men er større enn hos 'Purpurascens'. Bladene er grønne i utspringet, men blir gradvis mørkere for til slutt å bli blankt mørkegrønn-lilla på sensommeren via rødt. Treet ble funnet av M. Timuki i 1939, men ble ikke navngitt og distribuert før i 1946. God vekst og vakre bladfarger er de viktigste kjennetegnene ved denne purpurbladede eika. I tillegg er 'Timuki' betydelig mindre utsatt for mugg.