



Sorbus alnifolia



Høyde	8 - 12 (15) m
Bredde	4-8m
Krone	ovoid to round, half-open crown
Bark og grener	smooth dark grey bark, branches purplish-brown
Blad	oval, top with a short point, remarkable lateral veins, dull green, 5 - 11 cm
Høstfarge	oransje, rød, lilla
Blomster	in umbels, Ø approx. 5 cm, white, May/June
Frukt	round to oval, red with yellow, Ø 0.8 - 1.5 cm
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	well drained nutritious soil
Belegning	tåler delvis belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	fairly
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), gir mat til fugler
Anvendelse	avenyer og brede gater
Form	klarestamme tre
Opprinnelse	East Asia
Synonymer	Micromeles alnifolia

Opprinnelig vokser det i Øst-Asia og når en høyde på ca. 15 m der. I Europa blir det mindre, ca. 8-10 m. Treet har mørkegrå, glatt bark. Unge kvister er olivenbrune og blir senere mørkere. Bladknoppene er påfallende rødbrune. Det ovale bladet er svært likt det hos or (Alnus). Det har 10 - 15 par fremtredende årer, og bladkanten er fint dobbelttannet. Det er matt grønt på oversiden, lysegrønt på undersiden og svakt hårete til glatt. Om høsten farges den i nyanser av rosa, oransje og rødt. Blomstringen etterfølges av gule frukter som sakte blir røde. I forskjellige stadier danner de en spesiell pryddverdi om høsten. Kryssbestøvning er nødvendig for frukting, så det anbefales å plante flere eksemplarer sammen.