



Acer cappadocicum 'Rubrum'



Høyde	10 - 15 m
Bredde	6-9m
Krone	flattened, round, wide crown, half-open crown
Bark og grener	young twigs dark purple at first, later dark green
Blad	5/7 lobes, pointed, unfurling deep purple
Høstfarge	gul
Blomster	yellow-green corymbs, 6 - 7 cm, May
Frukt	winged
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	humic, not too dry
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	avenyer og brede gater
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Baumschulen Booth, Germany, 1838

Acer cappadocicum 'Rubrum' er lik den tidligere beskrevne 'Aureum' i alle deler og egenskaper. Den eneste forskjellen er bladfargen. De unge bladene på 'Rubrum' er dypt purpurøde og blir mørke rødgrønne i løpet av sommeren. Om høsten blir bladene dypgule. I motsetning til den gulbladede 'Aureum' er 'Rubrum' ikke utsatt for bladforbrenning i solrike perioder om sommeren. 'Rubrum' er et utmerket gate- og parktre, men tåler asfaltering dårligere enn den gulbladede 'Aureum'.