




## Acer negundo



<b>Høyde</b>	15 - 20 m, fast growing
<b>Bredde</b>	12-16m
<b>Krone</b>	wide, more or less round, half-open crown
<b>Bark og grener</b>	young twigs shiny green and pruinose
<b>Blad</b>	unevenly feathered, fresh green, up to 20 cm, feathered leaf
<b>Blomster</b>	male in thick clusters, female in racemes, April
<b>Frukt</b>	falcate, winged nutlets, in racemes
<b>Torner</b>	Ingen
<b>Giftighet</b>	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
<b>Jordtype</b>	few requirements, tolerant to calcereous soil
<b>Jordfuktighet</b>	tåler kort flom, tåler lang flom
<b>Belegning</b>	tåler ingen belegning
<b>Vinterherdighetssone</b>	5a (-28,8 til -26,1 °C)
<b>Vindmotstand</b>	moderate
<b>Andre motstander</b>	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
<b>Faunatre</b>	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), verdifull for sommerfugler
<b>Anvendelse</b>	industriområder
<b>Form</b>	klarestamme tre, flerstammet tre
<b>Opprinnelse</b>	central and eastern part of North America

Acer negundo er et mellomstort til stort tre som vokser raskt og har en bred krone. De unge kvistene er blankt grønne og vanligvis lysegråmattede. Det nederlandske navnet vederesdoorn har planten fått på grunn av de fligete bladene, et kjennetegn som bare denne arten og de avledede kultivarene har. Bladene er ujevnt flikete og har 3 til 7 småblad. A. negundo er tokjønnnet, og blomstene er enkjønnet. Han- og hunnblomster er plassert i separate blomster på forskjellige trær. Hannblomstene sitter i kompakte bunter med vanligvis fire blomster sammen. Hunnblomstene sitter i lange, hengende klaser. Som hos andre lønnearter har fruktene de typiske "vingene" som kalles samaraer. Treet vokser i både våte og tørre miljøer. Har en dyptgripende hovedrot med kraftig forgrening.