



Ligustrum vulgare 'Atrovirens'



Høyde	2-4 m
Bredde	2-4m
Krone	dark, dense crown
Bark og grener	brown, grey
Blad	green
Blomster	white, flowers in June-July
Frukter	black
Torner	Ingen
Giftighet	har giftige komponenter
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil
Belegning	tåler belegning
Vinterherdighetssone	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, gir mat til fugler
Anvendelse	tretonner, tak hager, kystområder, små hager, terrassehager

Ettersom 'Atrovirens' alltid forgrener seg fra basis, vil denne busken ikke utvikle en trelignende vekstform. Det er en meget kraftigvoksende busk som kan bli opptil 3,5 m høy. Bladene er ovale til eggformet avlange og har en sunn, mørkegrønn farge. Bladene faller noen ganger ikke av planten før i februar, noe som gjør den i praksis halvgrønn. Blomsterklasene er relativt små, 2-4 cm lange. I tillegg er planten ikke særlig blomsterrik. Blomstene er hvite og åpner seg rundt midten av juni til midten av juli. De kan etterfølges av blanke, svarte bær, men heller ikke disse produseres i store mengder. På grunn av sin gode vekst egner 'Atrovirens' seg svært godt som hekkplante. Men busken kan også fint brukes i blandede beplantninger, selv om andre, rikere blomstrende arter eller sorter da kan være å foretrekke. 'Atrovirens' ble introdusert av tyske Spätsche Baumschulen i 1888.

Herdighetssone 5a.