



Styrax obassia



Høyde	10 - 15 m
Bredde	5-8m
Krone	broad ovoid to round, half-open crown, capricious growing
Bark og grener	twigs reddish brown, bark grey, smooth
Blad	broad oval to round, dark green, 5 - 20 cm
Blomster	in racemes, 10 - 20 cm, white with yellow stamens, approx. 2 cm, June, fragrant flowers
Frukt	ovoid drupe, white to yellowish, hairy
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	light loamy and humic soil
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindmotstand	moderate
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), gir mat til fugler
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Japan, Korea, Northern China

Meget stor busk eller middels stort til stort tre med en bred, oval til rund krone. De unge kvistene er rødbrune, først hårete, senere mørklilla og nakne til lett flassende. Barken på eldre trær er grå og glatt. De store bladene er nesten runde med en iøynefallende spiss spiss. De er mørkegrønne. De to nederste bladene på hvert skudd sitter nesten overfor hverandre. De resterende bladene er spredt langs kvisten. Bladbunnen av bladene er utvidet, konkav og omslutter knoppen. Blomstene åpner i juni og henger i lange klynger. De enkelte blomstene er omtrent 2 cm store og hvite med gule støvdragere. De har en veldig sterk og behagelig duft. Treet blomstrer vanligvis veldig voldsomt og er da sterkt foretrukket av bier. Etter blomstene følger harde, eggformede, hvite til gulaktige stepper med mørkegrønt beger.