




Syringa vulgaris 'Maximowicz'



Høyde	4-6 m
Bredde	3-5m
Krone	round/spherical, half-open crown
Bark og grener	flaking, brown, grey
Blad	dark green
Blomster	voilet violet, flowers in May, fragrant flowers
Frukter	brown
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil, all soil types
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindmotstand	good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	tretønner, tak hager, små hager
Form	klarestamme tre, flerstammet tre

'Maximowicz' er en stor busk til et lite tre med en bred oval til rund krone som etter hvert blir 4-6 m høy og bred. De unge kvistene er svakt purpurøde. Den gamle barken er gråbrun og flasser av i små flekker senere i livet. De eggformede bladene er mørkegrønne. Blomsterrisene er lange og forholdsvis smale. De enkelte blomstene er ganske store. Blomsterknoppene er fiolett-lilla. De åpne blomstene er også fiolett-lilla. De er halvfylte til helt fylte, men det dannes også enkeltblomster. Kronbladflikene er ofte buede eller litt vridde. Utsiden av blomstene er lysere, noe som skaper en litt tofarget effekt. Blomstene åpner seg i slutten av april og begynnelsen av mai og har en sterk og behagelig duft. Syringa vulgaris Syringa vulgaris vokser i all næringsrik og humusrik jord. Planten foretrekker nøytral til kalkholdig jord. 'Maximowicz' er veldig godt egnet for bruk i parker og hager. I motsetning til hva navnet antyder, ble denne sorten introdusert i 1901 av Victor Lemoine & Fils i Nancy, Frankrike. Herdighetssone 4.

Sone 4