



Tilia platyphylllos



| | |
|-----------------------------|--|
| Høyde | 30 - 35 (40) m, fast growing |
| Bredde | 20-25m |
| Krone | broad ovoid to rounded, half-open crown |
| Bark og grener | light grey and grooved, twigs bare and brownish red |
| Blad | slanted heart-shaped, shortly tapered, matt green, 6 - 12 cm |
| Blomster | in pendulous umbels, 3 - 5 flowers together, yellow, June/July, fragrant flowers |
| Frukter | inverse ovoid, grey, Ø 0.8 - 1.2 cm, grey felt-like hair |
| Torner | Ingen |
| Giftighet | vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr |
| Jordtype | all |
| Belegning | tåler ingen belegning |
| Vinterhardighetssone | 4 (-34,4 til -28,9 °C) |
| Vindmotstand | good, susceptible to sea wind |
| Andre motstander | motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind |
| Faunatre | motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler |
| Form | klarestamme tre, flerstammet tre |
| Oprinnelse | Western, Central and Southern Europe |

Den storbladede linden har en bred, eggformet til avrundet krone og en avrundet topp. Stammen er tung og uregelmessig, lysegrå og senere rillet. De tunge sidegreinene sitter vanligvis lavt på stammen. Det vokser vanligvis mye rotlager ved basis av stammen. Årvistene er hårete og rødbrun, og de blir nakne om vinteren. Bladet på T. platyphylllos springer ut 14 dager tidligere enn T. cordata, og det er også større. Bladet er hjerteformet med en spiss spiss og en krokete hjerteformet basis, og bladkanten er skarpt takket. På oversiden er bladene mørkegrønne, på undersiden er de lysere grønne og mykt hårete. De duftende blomstene vokser i hengende klaser, 3 til 5 sammen, og høybladene er tydelig stilkede og ca. 5 cm lange. T. platyphylllos er ikke veldig utsatt for bladlus. Veldig sterkt tre.