



Ulmus minor



Høyde	20 - 30 m, fast growing
Bredde	12-15m
Krone	broad fan-shaped to broad oval, half-open crown, capricious growing
Bark og grener	has brownish-grey grooves, flakes off in platelets, twigs brown
Blad	oval-elongated to obovate, glossy green, 5 - 10 cm
Blomster	in ver-ødense bundles, purplish-red, March, before the leaves emerge
Fruktar	winged nutlet, 1.5 - 2 cm
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	moist and light, favours calcareous soils
Jordfuktighet	egnet for våt jord, tåler kort flom, tåler lang flom
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindmotstand	very good, also tolerates sea wind
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	avenyer og brede gater, kystområder, industriområder
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	western Europe, north Africa, south-west Asia
Synonymer	Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris

Høyt tre med tett krone og varierende vekstform, fra bred vifteformet til bredoval. På de nakne kvistene dannes det av og til et korklag. Bladene er ovale-lansettformede til omvendt ovale med størst bredde i eller over midten. Glatt og blankt grønt på oversiden, nesten bart på undersiden. Bladbasen dekker den ene siden av bladstilken, noe som er karakteristisk for almeblader. Bladranden er dobbelttannet. Blomstene er ordnet i veldig tette bunter på 15 - 30 sammen. De dukker opp før bladutviklingen og er purpurrøde. De rundvingede fruktene er også ofte til stede før bladutviklingen, først grønne, men senere brune. Mottakeligheten for almesyke er ganske høy. Ulmus minor ble tidligere plantet i stor utstrekning, men er nå lite dyrket.