




Zanthoxylum schinifolium



ja

Høyde	3 - 4 m
Bredde	3-4m
Krone	round, half-open crown, capricious growing
Bark og grener	twigs brown, with one flat thorn under each bud, bark grey
Blad	imparipinnate with 11 - 21 leaf segments, elongated-oval, dark green, 2 - 3 cm, feathered leaf
Høstfarge	gul
Blomster	in axillar ♂ clusters, green to brown-green, July/August
Frukt	fleshy, round capsules, green to brownish red, aromatic
Torner	Ja
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements
Belegning	tåler ingen belegning
Vinterherdighetssone	6 (-23,3 til -17,8 °C)
Vindmotstand	fairly to good
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), kan tåle vind, verdifull for sommerfugler
Anvendelse	tretønner, tak hager
Form	klarestamme tre, flerstammet tre
Opprinnelse	Eastern China, Korea, Japan

Vokser fra en buskform til et lite, noen ganger flerstammet tre med en rund krone. På kvistene er det en flat torn under hver knopp. I gammel bark er disse tornene noen ganger fortsatt synlige som små pukler. De grasiøse, uligefinnede bladene består av 11 til 21 mørkegrønne, avlange, ovale småblad. Bladranden har fine, avrundede tenner og innskårne spisser. Bladspindelen er hårløs og dekket av fine pigger på undersiden. Om høsten blir bladene gule. De kompakte bunter med grønne til brungrønne blomster åpner seg i juli og august. De etterfølges av små grønne til brunrøde, kuleformede, kjøttfulle boksfrukter som inneholder svarte frø. I likhet med *Z. piperitum* males frøene i Japan og brukes som pepper i retter. Et parktre med få krav til jordsmonn.