




Sorbus alnifolia var. submollis



Høyde	8-12 m
Bredde	4-8m
Krone	avoid to round
Bark og grener	dark grey
Blad	dark green
Høstfarge	oransje, rød
Blomster	white, flowers in May-June
Frukt	yellow to orange and red
Torner	Ingen
Giftighet	vanligvis ikke giftig for mennesker, (store) kjæledyr og husdyr
Jordtype	sandy soil, acid soil
Belegning	tåler delvis belegning
Vinterherdighetssone	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindmotstand	fairly
Andre motstander	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6)
Faunatre	motstandsdyktig mot frost (WH 1 - 6), gir mat til fugler
Anvendelse	avenyer og brede gater, smale gater, tretønner
Opprinnelse	U.S. National Arboretum, Washington D.C., USA, 2003

Den naturlige sorten submollis skiller seg ikke mye fra arten Sorbus alnifolia. Det er et lite til mellomstort tre på 8-12 m med en lukket, eggformet til rund krone. Barken er mørkegrå og glatt, og de unge kvistene er grønnbrune med påfallende rødbrune bladknopper. De ovale bladene ligner noe på bladene til Alnus spaethii, men er mindre. Hos arten Sorbus alnifolia er bladene glatte på begge sider. Hos var. submollis er undersiden av bladene litt hårete. Selv på eldre blader kan denne behåringen fortsatt sees i åreryggene. Om høsten får bladene en attraktiv rosa, oransje og rød farge. I mai-juni åpner de hvite blomstene seg i ca. 5 cm brede klaser. Mens blomsterstilkene hos arten S. alnifolia er hårløse, er de hos var. submollis dunhårede. Blomstene etterfølges av runde til ovale frukter som går fra gul til rød. Krysspollinering er nødvendig for god fruktsetting. Plant derfor alltid minst to trær i nærheten av hverandre. Sorbus alnifolia var. submollis forekommer i det sentrale Kina, Korea og Japan. Treet vokser helst i veldrenert, fruktbar jord. Herdighetssone 4.